

Таблица

Дифференциально-диагностические признаки холеры и других схожих заболеваний *

Клинические признаки	Холера	Острая дизентерия	Пищевая токсикоинфекция	Ротавирусный гастроэнтерит	Острые кишечные инфекции, вызванные неагглютинирующими вибрионами
Стул	Водянистый, часто обесцвеченный, цвета рисового отвара, иногда с запахом сырой рыбы	Скудный, иногда бескаловый, с примесью слизи и прожилками крови	Водянистый с неприятным запахом, часто с примесью зелени, цвета болотной тины	Водянистый, обильный, пенистый, иногда ярко-желтого цвета	Часто кашицеобразный, при тяжелом течении водянистый
Дефекация	Безболезненная	С тенезмами	Болезненная при колитическом варианте	Безболезненная	Безболезненная
Боль в области живота	Не характерна	Часто сильная, иногда с ложными позывами	Часто сильная, схваткообразная	Умеренная	Умеренная
Боль иной локализации	Не характерна	В низу живота и в левой подвздошной области	В эпигастрии и мезогастррии	Разлитая	Разлитая
Рвота	Множественная водянистая, не приносящая облегчения	При тяжелом течении	Множественная, приносящая облегчение	До 3–4 раз в сутки, часто одновременно с поносом	До 5–10 раз в сутки, обычно после появления поноса
Урчание в животе	Звучное и постоянное	Не типично	Незвучное, изредка	Громкое	Звучное, непостоянное
Спазм и болезненность в области сигмовидной кишки	Не отмечаются	Характерны	Встречаются при колитическом варианте	Не отмечаются	Не отмечаются
Изменения слизистой оболочки мягкого неба	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Гиперемия и зернистость	Отсутствуют
Дегидратация III–IV степени	Типична	Не отмечается	Редко	Не отмечается	Редко
Температура тела	Нормальная или пониженная	Повышенная	Повышенная, но может быть нормальной	Субфебрильная	Нормальная
Озноб	Не характерен	Типичен	Типичен	Редко	Не характерен

* Еремущин Я. М., Белова Е. Г., Бурчик М. А., Савина А. В., Бормотова Т. В., Кочарян К. А. Эпидемиологические мероприятия при холере // *Лечащий Врач*. 2006. № 4

Схемы применения антибактериальных препаратов в лечении больных холерой (I, II степень дегидратации) *

Антибактериальный препарат	Разовая доза, г	Кратность применения в сутки	Средняя суточная доза, г	Продолжительность курса лечения, сутки	Средняя доза на курс лечения, г
Тетрациклин	0,3	4	1,2	5	6,0
Доксициклин	0,2	1	0,2	5	1,0
Ципрофлоксацин	0,25	2	0,5	5	2,5
Офлоксацин	0,2	2	0,4	5	2,0
Пефлоксацин	0,4	2	0,8	5	4,0
Норфлоксацин	0,4	2	0,8	5	4,0
Ломефлоксацин	0,4	1	0,4	5	2,0
Левомецетин	0,5	4	2,0	5	10,0
Триметоприм/сульфаметоксазол	0,16/0,8	2	0,32/1,6	5	1,6/8,0
Триметоприм/сульфамонетоксин	1,0/0,4	2	0,8/2,0	5	4,0/10,0
Рифампицин/триметоприм	0,3/0,08	2	0,6/0,16	5	3,0/0,8

Примечание: Препараты в указанных схемах применяются внутрь.

* Еремущин Я. М., Белова Е. Г., Бурчик М. А., Савина А. В., Бормотова Т. В., Кочарян К. А. Эпидемиологические мероприятия при холере // *Лечащий Врач*. 2006. № 4

Таблица

Этиотропные препараты для лечения инфекционных осложнений атопического дерматита *

Название препарата / торговые названия	Форма выпуска	Дозировка	Побочные действия	Противопоказания
Цефалоспорины I поколения				
Цефазолин (Кефзол, Цефамезин, Цефаприм)	Флаконы по 250 мг, 500 мг, 1 г для в/м и в/в инъекций	100 мг/кг/сут, 2 раза в день	Тошнота, рвота, анорексия, псевдомембранозный колит, аллергические реакции	Повышенная чувствительность к цефалоспорином
Цефалоспорины II поколения				
Цефаклор (Цеклор)	Капсулы для приема внутрь по 250 и 500 мг	25 мг/кг/сут, 3 раза в день	Тошнота, рвота, диарея, холестатическая желтуха, головокружение, лейкопения, аллергические реакции	Повышенная чувствительность к цефалоспорином
Цефуросим (Зинацеф, Кетоцеф, Зиннат)	Флаконы по 250, 750 мг и 1 г для в/м и в/в инъекций	100 мг/кг/сут, 2 раза в день	Аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит, анемия, лейкопения, болезненность при введении	Повышенная чувствительность к цефалоспорином
Цефалоспорины III поколения				
Цефотаксим (Клафоран), Цефтазидим (Тазицеф, Фортум)	Флаконы по 1 г для в/м и в/в инъекций	100 мг/кг/сут, 2 раза в день	Анемия, лейкопения, тромбоцитопения, диспептические явления, аллергические реакции, обратимая энцефалопатия	Повышенная чувствительность к цефалоспорином, лидокаину, возраст до 2,5 лет
Аминогликозиды				
Гентамицин, гарамицин	Ампулы для инъекций 2 мл (в 1 мл — 40 мг, 20 мг)	3–5 мг/кг/сут в 2 приема	Тошнота, рвота, нефротоксическое действие, ототоксическое действие, аллергические реакции	Неврит слухового нерва, нарушение функции почек, повышенная чувствительность к препаратам из группы аминогликозидов
Макролиды				
Эритромицин	Таблетки по 250 и 500 мг	30–50 мг/кг/сут, в 4 приема	Нарушение функции печени, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, аллергические реакции	Нарушения функции печени, повышенная чувствительность к макролидам
Кларитромицин (Клацид)	Таблетки по 250 мг, флаконы по 1 г для инъекций	7,5 мг/кг/сут, в 2 приема	Тошнота, рвота, боли в эпигастрии, повышение активности печеночных трансаминаз, аллергические реакции, головная боль	Повышенная чувствительность к макролидам
Рокситромицин (Рулид)	Таблетки по 50, 100 и 300 мг	5–8 мг/кг/сут, в 2 приема	Тошнота, рвота, боли в эпигастрии, повышение активности печеночных трансаминаз и щелочной фосфатазы, аллергические реакции	Повышенная чувствительность к макролидам, одновременный прием препаратов типа эрготамина
Спирамицин (Ровамицин)	Таблетки по 1,5 млн МЕ, 3 млн МЕ	1,5 млн МЕ/10 кг массы, в 2–3 приема	Тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь	Повышенная чувствительность к препарату
Противогрибковые препараты Итраконазол (Орунгал)	Капсулы по 100 мг	5 мг/кг/сут, 1 раз в день	Диспепсия, боли в животе, транзитное повышение активности трансаминаз, головная боль, периферические нейропатии, аллергические реакции, синдром Стивенса–Джонсона	Повышенная чувствительность к итраконазолу; одновременный прием внутрь терфенадина, астемизола, цизаприда, мидазолама
Флуконазол, Дифлюкан	Капсулы по 50, 100, 150, 200 мг	3–5 мг/кг/сут, 1 раз в день	Тошнота, боль в животе, диарея, метеоризм, кожная сыпь, головная боль, лейкопения, эксфолиативные кожные заболевания	Повышенная чувствительность к препарату
Ацикловир (Зовиракс)	Таблетки по 200, 400 и 800 мг, сухое вещество для приготовления раствора для инфузий (1 амп. — 250 мг)	В/в капельно через систему линеомат 5 мг/кг (разовая доза), 3 раза в день per os — 5–10 мг/кг, 3–5 раз в день	Тошнота, рвота, диарея, кишечная колика, повышение уровня билирубина, ферментов печени, мочевины и креатинина, головная боль, спутанность сознания, галлюцинации	Повышенная чувствительность к препарату

* Атопический дерматит и инфекции кожи у детей: диагностика, лечение и профилактика. Пособие для врачей. М., 2004.